1 : auge glaciaire, 2 : cirque, 3 : lac de cirque ou d'ombilic, 4 : verrou, 5 : limite de polissage du glacier, 6 : paroi de vallée en U, 7 : épaulement (en cas de vallées emboîtées), 8 : cannelures, 9 : gradin, ressaut de vallée, 10 : terrain glaciaire, 11 : drumlin, 12 : roche moutonnée, 13 : moraine de fond, 14 : moraine de « poussée » et vallum morainique, 15 : moraine de « retrait » ou moraine terminale, 16 : gorge, 17 : esker, 18 : kames.

Figure 3 : sédimentation / érosion au niveau d'un méandre

Méandres de l'Allier

Figure 4 : formation de terrasses emboîtées

Jerz H. 1995
in Benda L. (ed.)

Figure 6 : Delta du Mississippi et organisation d'un delta (u-laval.ca)

(A) Vue en carte

(B) Vue en coupe

Sédimentation détritique : frontière continent–océan

Canyon sous-marin

Le Canyon de Monterey (Californie, U.S.A.)

Exemple d'un canyon sous-marin actuel. Les canyons piègent les sédiments côtiers en mouvement (dérive littorale, crues, tempêtes, glissements...) et permettent leur transit vers le bassin profond (images: MBARI).

(Total)

Sédimentation détritique : frontière continent–océan

Deltas

Delta du Colorado

Sédimentation détritique : frontière continent–océan

Deltas

Delta du Rhône
(SPOT)

Sédimentation détritique : frontière continent–océan

Deltas

Delta du Mississippi

Sédimentation détritique : frontière continent–océan

Deltas

Delta du Mississippi

Sédimentation détritique : frontière continent–océan

Estuaire

Un exemple moderne: l'Estuaire de la Gironde

Landsat image courtesy univ-bordeaux

Sédimentation détritique : frontière continent–océan

(Total)

Mécanismes de formation des rides de courant.

A. Rides façonnées par un courant bidirectionnel de type houle

Vue de dessus

Vue en coupe

Schéma interprétatif

B. Rides façonnées par un courant unidirectionnel de type dérive littorale, fleuve...

Vue de dessus

Vue en coupe

(la flèche noire indique le haut de la série)

Schéma interprétatif

→ Mouvement du fluide
→ Mouvement des particules

Transport des particules sédimentaires : figures sédimentaires

Flute marks dans un grès fin. La flèche indique le sens du courant.
(www2.ulg.ac.be)

Transport des particules sédimentaires : figures sédimentaires

Figure en croissant formée autour d'un fragment de tourbe.
La flèche indique le sens du courant.

(www2.ulg.be).

Transport des particules sédimentaires : figures sédimentaires

Exemples de **rides de courant** :

A: rides rectilignes de grande taille, B: rides plus sinueuses

(www2.ulg.be).

Transport des particules sédimentaires : figures sédimentaires

Mégarides dans le chenal de la Somme, à marée basse
(www2.ulg.be).

Figure 9 : diagramme d'Allen : structures sédimentaires en fonction de la vitesse de l'écoulement et de la taille des particules (in CAPES 09)

Figure 10 : figures entrecroisées

Elle sont caractérisées par la superposition de lamines obliques de sens opposé . Cette structure est produite surtout au niveau de la zone tidale par les inversions périodiques des courants de marée. On observe souvent une surface de réactivation qui entame les lamines obliques antérieures (cette surface est produite au moment où le courant change de direction).

C. Rides façonnées par deux courants unidirectionnels de sens opposé type marées

Vue en coupe

Environ 50 cm

Lamines associées au courant de sens 2
Lamines associées au courant de sens 1

Schéma interprétatif

Transport des particules sédimentaires : figures sédimentaires

Turbidite, grès

Modèle de dépôt d'un cône sous-marin développé à partir d'une source unique de matériaux argilo-sableux apportés par un delta et convoyés par un canyon sous-marin et processus gravitaires sur le talus.

Figure 11 : turbidites du col de vars (flysch à helminthoides)

Hydrodynamisme décroissant

1 à quelques dizaines de m.

Granoclassement décroissant

Figure 12 : Processus gravitaires (in Cojan et Renard)

Les différents processus gravitaires.

Figure 14 : carte de répartition des principaux types de sédiments
 (in Cojan et Renard, Dunod 2006)

Sédiments océaniques :

Sédiments de la marge continentale

Sédiments terrigène dont les turbidites (en hachuré)

Sédiments carbonatés
 > 60% < 60%

Argiles rouges
 ($\text{CaCO}_3 < 30\%$)

Terres émergées

Principales dorsales océaniques

Figure 15 : Répartition actuelle des dépôts océaniques profonds
(in Pomerol et al., Dunod, 2005)

Modélisation schématique de la réponse de la sédimentation pélagique à la mobilité lithosphérique.

Au site 5 (au-dessus de la lysocline), les sédiments métallifères qui recouvrent les basaltes sont surmontés de boues carbonatées à Foraminifères et Nannofossiles. Le sondage 4 (entre lysocline et CCD) met en évidence une raréfaction voire une disparition des Foraminifères (plus sensibles à la dissolution). Le sondage 3 (sous la CCD) marque l'apparition des argiles rouges des grands fonds. Le sondage 2 au niveau de la zone de haute productivité équatoriale, voit le retour des faciès carbonatés (approfondissement de la CCD) ou le développement des faciès biogènes siliceux (Radiolaires). La sortie de la zone équatoriale (sondage 1) se marque par la récurrence du faciès argiles rouges des grands fonds (remontée de la CCD).

Figure 16 : saturation en CaCO_3 des océans en fonction de la profondeur
(in Cojan et Renard, Dunod, 2006)

Évolution, en fonction de la profondeur, du degré de saturation en CaCO_3 (par rapport à la calcite et à l'aragonite) des eaux de l'Atlantique et du Pacifique (d'après Li, Takahashi et Broecker, 1969 in Ivanoff 1972).

Figure 17 : notion de lysocline
(in Segarra et al., à paraître)

Bioprécipitation des roches carbonatées, stromatolites

Bioprécipitation des roches carbonatées, stromatolites

© P.-A. Bourque

Bioprécipitation des roches carbonatées, stromatolites

Figure 18 : les stromatolites (d'après www.ggl.ulaval.ca)

Coupe d' un stromatolite

Surface d'un tapis de cyanobactéries et d'algues.

Stromatolithes actuels dans le Jura (planet-terre.ens-lyon.fr)

Figure 20 : Deux exemples de plate forme carbonatée : en rampe (A) ou barrée par un récif (B).

Modèle sédimentologique d'une plate-forme peu profonde.

Figure 21 : des récifs actuels aux récifs fossile

FIG. 1 – *Diceras*, l'un des premiers Rudistes. Les deux valves sont de taille voisine. Jurassique supérieur

FIG. 2 – *Toucasia*, Rudiste inéquivalve à coquille spiralée. La valve gauche est la plus grande et fixée. Crétacé supérieur

FIG. 3 – *Hippurites*, Rudiste inéquivalve à coquille droite. La valve droite est la plus grande et fixée. Crétacé supérieur

FIG. 4 - *Requienia*. Présent notamment dans l'Urgonien

Carrières de Comblanchien, montrant les niveaux exploités à la base, le Comblanchien fracturé au dessus (blanc), la pierre de Corton (brune) et les marnes bleues calloviennes

Pont de Tolbiac à Paris en Comblanchien.

Exosquelette d'un polype

Bioprécipitation des roches carbonatées, plateformes

Récif barrière en Nouvelle calédonie

Bioprécipitation des roches carbonatées, plateformes

Grande Barrière, Australie

Bioprécipitation des roches carbonatées, haut-fond

Haut-fond, Antilles

Bioprécipitation des roches carbonatées, haut-fond

Coupe dans la région de Three Creeks

Bahamas

Bioprécipitation des roches carbonatées

Classification des récifs

Carrière de Larche, Ardennes

Bioprécipitation des roches carbonatées

Récif fossile, Ardennes

Foraminifères

Globigerina rubescens. Espèce essentiellement tropicale et subtropicale.

Globorotalia menardii menardii. Espèce tropicale et subtropicale commune.

Précipitation chimique : les évaporites

Dépôt de halite dans la Sabkha El Melah, Tunisie (www2.ulg.ac.be)

Précipitation chimique : les évaporites

A: couches plissées (slump) formées de croûtes de gypse ("gazon sélénitique"); B: détail montrant les cristaux prismatiques.
Messinien. Heraklea Minoea. Sicile

Fig. 3. – Coupe schématique de la Sebkhah el Melah.

Évaporites marines		Évaporites non-marines	
halite	NaCl	halite	NaCl
sylvite	KCl	sylvite	KCl
carnalite	KMgCl ₃ , 6H ₂ O	anhydrite	CaSO ₄
kaïnite	KMgClSO ₃ , 3H ₂ O	epsomite	MgSO ₄ , 7H ₂ O
anhydrite	CaSO ₄	trona	Na ₂ CO ₃ .NaHCO ₃ , 2H ₂ O
gypse	CaSO ₄ , 2H ₂ O	mirabilite	Na ₂ SO ₄ , 10H ₂ O
polyhalite	K ₂ MgCa ₂ (SO ₄) ₄ , 2H ₂ O	thenardite	Na ₂ SO ₄
bischofite	MgCl ₂ , 6H ₂ O	bloedite	Na ₂ SO ₄ .MgSO ₄ , 4H ₂ O
kieserite	MgSO ₄ , H ₂ O	gaylussite	Na ₂ CO ₃ .CaCO ₃ , 5H ₂ O
		glauberite	CaSO ₄ .Na ₂ SO ₄

Les différentes espèces minérales des dépôts évaporitiques marins et continentaux.

Figure 27 : domaines des différentes évaporites en fonction de la température et de l'évaporation