

#### A L'ISSUE DE CE TP, JE DOIS SAVOIR

#### Techniques expérimentales à maîtriser :

- Réaliser une préparation microscopique classique ou en frottis
- Réaliser des coupes transversales fines de feuille à main levée

#### Capacités:

- Représenter sous forme de dessin d'observation
- Identifier les principaux types de jonctions intercellulaires sur des clichés de microscopie électronique (sera vu plus en détail en cours)
- Identifier les partenaires d'une association interspécifique impliquant des microorganismes par observation microscopique (microbiote intestinal, nodosité).

### I. Organisation cellulaire d'une feuille d'Angiosperme


#### A. Observation de coupe transversale de feuille d'Angiosperme.

Cellule


garde

stomatique =

cellule de





coupe transversale de limbe foliaire




http://lycee.nicolas-cohen.org








CT de feuille de dicotylédone observée au MO au x10




CT de feuille de houx observée au MO au x10












#### **Double coloration au carmino vert :**

- en rose des **parois pectocellulosiques** souples et hydrophiles
- en vert des **parois lignifiées** (lignine : polymère hydrophobe de monolignols), **rigides et hydrophobes**
- en vert-marron des **parois subérifiées** (subérine : polymère hydrophobe d'acides gras et d'alcools à très longes chaînes, de cires et de composés phénoliques) **hydrophobes**
- en vert-jaune des **parois cutinisées** (cutine : longues chaînes hydrophobes de nature lipidique) **hydrophobes**









## B. Relation structure / fonction des principaux types de tissus foliaires








Cliché de MET d'une cellule de parenchyme palissadique




## Cliché de MEB de tissu épidermique foliaire









# **Empreintes stomatiques**







## Cliché de MEB d'un élément de vaisseau de xylème




## Cliché de MEB d'un élément de vaisseau de xylème







A FIGURE 44. Les éléments conducteurs du xylème. D'après CAMPBELL& REECE (2004).


# Cliché de MET d'un tube criblé de phloème








### Rappels : structure du phloème. Tubes criblés + cellules compagnes







Cellules et tubes criblés.

#### ▲ FIGURE 46. Cellules criblées et cribles. D'après CAMEFORT (1977).

a : portion de tube criblé vue en coupe longitudinale; b : crible simple vu de face (Courge); c : crible composé vu de face; d : vu en coupe [Vigne].

## **BILAN**: relation S/F des différents tissus foliaires







## Relations structure-fonction des principaux types cellulaires d'une feuille d'Angiosperme


Tissu	Type cellulaire	Caractéristiques structurales	Fonction
Epiderme	Cellule épidermique  Stomate : ostiole et cellule de garde		
Parenchyme foliaire	Cellule du parenchyme palissadique  Cellule du parenchyme lacuneux		
Tissus conducteurs	Xylème  Phloème		

Tissu	Type cellulaire	Caractéristiques structurales	Fonction
Epiderme	Cellule épidermique	Cellule non photosynthétique, aplatie, et recouverte d'une épaisse cuticule	Protection mécanique et hydrique
	Stomate : ostiole et cellule de garde	Paroi +/-épaisse -> ouverture de l'ostiole	Echanges gazeux et leur contrôle
	Cellule du parenchyme palissadique	Nombreux chloroplastes Située sur la face supérieure	Photosynthèse
Parenchyme foliaire	Cellule du parenchyme lacuneux	Nombreux chloroplastes Située sur la face supérieure	Photosynthèse Circulation des gaz dans les espaces
Tissus conducteurs	Xylème	Elément de vaisseau, paroi hydrophobe élastique, cellule morte, perforations + ponctuations	Conduction de la sève brute
	Phloème	Tube criblé, cellule vivante, cribles	Conduction de la sève élaborée






### C. Cohésion et communication entre cellules végétales




La paroi des cellules végétales (× 45 000).

Racine de pois. Im : lamelle moyenne, mp : membrane plasmique. (Cliché tiré de « Atlas de biologie cellulaire », J.-C. Roland, J.-C. Callen, A. et D. Szöllösi, 5e éd. Dunod, 2001.)




D'après Campbell et Reece (2004)




Plasmodesmes vus en coupe (× 35 000). (Cliché tiré de « Biologie cellulaire », J.-C. Callen, 2° éd. Dunod, 2005.

II. Organisation cellulaire de la paroi intestinale de Mammifère.

A. Etude histologique de la paroi intestinale.



▲ Figure 12. Organisation la paroi de l'intestin grêle. D'après Silverthorn et al. (2007).





#### Intestin grêle : duodenum


Cellules caliciformes : mucus protecteur

Glandes de Lieberkühn


- enzymes digestives (maltase)
- lysozyme










## CT d'intestin grêle de mammifère








# Intestin grêle de mammifère





Structure d'un entérocyte








Photo d'étudiant





100 pm

Dellin d'abrevletion d'une CT d'invertion grêle de monnigere abrevlée au 11.0: 1 Willoute fibracytes Copillaire songuin Charian M - Epin Filium Ellules musculsines Kirry Canjanckof de remplissage lame bosole Drebehe , fais der braits rets. aypte Bonne obseration. - musculsire magazine apillares songuins glande de Brunner KiNU SM Campan dif (FO) muscles evile M = Mugueme odventile / Néverie SM = Son - Muguerre 9110 100 11mm



## B. Etude de l'épithélium intestinal





lumière

microvillosités


jonctions intercellulaires mitochondries


cytosol


cellule épithéliale (=entérocyte)

membrane plasmique

noyau









Desmosome: résistance mécanique


FI : filaments intermédiaires






Jonction étanche = serrée : étanchéité






Jonction gap: communication

#### Utilisation de l'objectif à immersion x100 : principe optique



#### Utilisation de l'objectif à immersion x100



Bien nettoyer l'objectif ensuite!!

#### III. Des associations interspécifiques entre organisme pluricellulaire eucaryote et microorganismes.


A. Des associations interspécifiques au sein des nodosités racinaires de Fabacées.

#### Réalisation et coloration d'un frottis de nodosité racinaire :


- Repérer des nodosités sur les racines de Trêfle ; prélever une nodosité à l'aide d'une pince fine.
- Broyer la nodosité entre 2 lames de verre et réaliser un frottis
- Laisser sécher quelques minutes
- Recouvrer le frottis sec d'alcool à 90° et laisser reposer 2 minutes
- Jeter l'excès d'alcool et laissez sécher
- Coloration au bleu de méthylène :


recouvrir le frottis sec d'une solution de **bleu de méthylène** à 2% pendant **2 minutes** laver d'un jet de pissette d'eau distillée laisser sécher et **observer sans lamelle à l'objectif à immersion x100** 


NB: on peut aussi observer le frottis sans le colorer




Nodosités à la loupe binoculaire. D'après BOUTIN et al. (2015).








Frottis de nodosités, coloration au bleu de méthylène, observation au x100




Bactéroïde en massue


Frottis de nodosités, sans coloration, observation au x100





Bactéries du genre Rhizobium colorées par un test de Gram après dissociation d'une nodosité et étalement de son contenu (frottis)





1 : noyau

2 : bactéroïde

3 : Vésicule contenant un bactéroïde

5 : cytoplasme

6 : paroi

## B. <u>Des associations interspécifiques au sein de l'intestin</u>.

Lame commerciale bactéries de l'intestin, observation au x100

